

フルミスト点鼻液の接種をご希望の方へ

○当院では、第一三共の経鼻インフルエンザワクチン「フルミスト」を使用します。

日本初となる、**鼻の中へ噴霧するタイプ**のインフルエンザ生ワクチン(3 価)です。

鼻の中へ噴霧するため針を刺す必要がありませんが、**鼻水が出ていると効果が落ちる可能性がある**ため、鼻水が多い方や泣いてしまうお子さんは難しい場合があります。

○対象年齢：**2～18 歳未満**(当院では 18 歳未満が対象です)

○接種回数：**1 回** 当院価格 9000 円(税込み)

○注射タイプと比べ、効果持続期間が長いと言われています。(半年～1 年)

○接種できない方

- ・対象年齢以外
- ・37.5℃以上の発熱がある
- ・免疫機能に異常がある
- ・副腎皮質ホルモン剤(経口剤、注射剤)、免疫抑制剤(経口剤、注射剤)を使用している
- ・妊娠している

○接種要注意の方

- ・重篤な急性疾患、慢性疾患がある
- ・サリチル酸系医薬品(アスピリン、サリチル酸ナトリウム)、ジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)、メフェナム酸(ポンタール)を使用している
- ・重度の卵アレルギーがある
- ・ゼラチンアレルギーがある
- ・鼻づまりが強い
- ・近親者に先天性免疫不全症の者がいる

○注意事項

- ・生ワクチンなので、弱毒化したインフルエンザウイルスに罹患するようなイメージです。
- そのため接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。
まれにショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。

- ・接種後一定期間(少なくとも 1 週間程度)は**インフルエンザ迅速検査で陽性反応を示す可能性**があります。

・接種時に号泣するお子さまの場合、多量の鼻水でワクチンがうまく鼻腔に入らず、効果が弱ってしまう可能性があります。より効果を発揮させるため、直前にティッシュで鼻かみをおすすめします。

※鼻吸引等の処置は致しませんので、鼻水が気になる方は注射ワクチンの方がよいかもしれません。

・他のワクチンとの**同時接種は当院では行いません**。（泣いてしまう可能性が高くなるため）

・接種後の入浴や軽いジョギングなど通常の生活は可能ですが、接種後すぐの過度な運動、スイミングは控えて下さい。

・接種後 1～2 週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けて下さい。

○予約変更等の注意事項

！！当日の注射ワクチンへの変更はできません！！

・来院までの電話でお受けできる変更内容は、**体調不良時の日時変更のみ**です。

また、来院されてからの患者様希望での日時変更はお受けできません。

きょうだいの日程あわせはお断りする場合があります。できるだけご予約どおりに来院頂けると大変助かります。

・注射へ変更をご希望は、フルミストをキャンセルした上でインターネットより改めてご予約ください。ただし、在庫がない場合はご予約出来ませんのでご注意ください。

・規定が非常に多いと思いますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。